

EPRINOMECTIN INJECTION
1%乙酰氨基阿维菌素注射液

Bimeprine[®] 艾必净[™]

广谱 | 高效 | 安全 | 弃奶期短

【作用与用途】

大环内酯类抗寄生虫药。主要用于驱杀牛体内寄生虫如胃肠道线虫、肺线虫以及体外寄生虫如蜱、螨、虱、牛皮蝇蛆、纹皮蝇蛆等。



长效驱杀内外寄生虫及幼虫

安全高效适用于泌乳动物

全球工艺, 专利佐剂



活性成分

1%乙酰氨基阿维菌素注射液

适应症

许可适用于奶牛和肉牛，治疗多种寄生虫感染，包括：

- 胃肠道蛔虫
- 肺蠕虫
- 牛蝇（寄生阶段）
- 疥螨
- 吸虱
- 啮毛虱
- 角蝇

使用适应症

治疗以下对乙酰氨基阿维菌素敏感的寄生虫及幼虫感染：

牛：

寄生虫	成虫	L4幼虫	抑制L4
胃肠道蛔虫	✓	✓	✓
奥氏奥斯特线虫	✓	✓	✓
竖琴奥斯特线虫	✓		
柏氏血矛线虫	✓	✓	
艾氏毛圆线虫	✓	✓	
蛇形毛圆线虫	✓	✓	
古柏线虫	✓	✓	✓
肿孔古柏线虫	✓	✓	
点状古柏线虫	✓	✓	
带状古柏线虫	✓	✓	
茹拉巴德古柏线虫	✓	✓	
牛仰口线虫	✓	✓	
微黄细颈线虫	✓	✓	
辐射食道口线虫	✓	✓	
结节线虫	✓		
褪色毛首线虫	✓		
肺蠕虫	✓	✓	✓
牛肺线虫	✓	✓	

产品优势

- 适用于奶牛和肉牛
- 体内体外同驱
- 弃奶期短
- 治疗包裹的奥氏奥斯特线虫、蛔虫
- 持久疗效

目标种属

牛（肉牛和奶牛）。

牛蝇（寄生阶段）：

牛皮蝇、纹皮蝇

疥螨：

牛足螨；牛疥螨

吸虱：

牛颞虱；牛血虱；牛管虱

啮毛虱：

牛毛虱

角蝇：

西方角蝇

蜱：

全沟硬蜱；草原革蜱；亚东璃眼蜱

妊娠期和哺乳期使用

实验室研究未发现任何证据表明，在治疗剂量下使用乙酰氨基阿维菌素会产生致畸或胚胎毒性影响。该兽药在牛妊娠期和哺乳期以及繁殖公牛中的安全性已经得到证实。可用于妊娠期、哺乳期以及公牛。

用法用量

该产品仅能通过皮下注射的方式给药。牛、羊推荐剂量为每100公斤体重2ml艾必净[™]，注射部位为牛肩部前后或颈部后方的松弛皮肤，以及羊颈部的上方。

过量

在给药剂量的5倍给药后，未观察到任何毒性体征。

弃奶期和休药期

肉和内脏：1天

牛奶：1天

该产品可以保护动物免受再次感染：

寄生虫	用药后保护时间
微黄细颈线虫	14天
艾氏毛圆线虫	21天
牛肺线虫、柏氏血矛线虫、肿孔古柏线虫、点状古柏线虫、茹拉巴德古柏线虫、辐射食道口线虫和奥氏奥斯特线虫	28天
疥螨	42天
虱	28天
蜱	48天

公司：百美达(中国)

网站：www.bimeda.cn/zh

地址：上海市普陀区武宁路19号丽晶阳光大厦2310室

电话：021-52821781

邮箱：cn-sales&marketing@bimeda.com

